

Grutto-inventarisatie in twee bezoeken

Er worden twee gebiedsdekkende inventarisatierondes uitgevoerd binnen het broedseizoen van de Grutto. De werkwijze volgt zoveel mogelijk die van het Broedvogelmonitoring Project (BMP, van Dijk & Boele 2011). Vergeleken met het BMP worden er alleen minder bezoeken uitgevoerd; deze zijn wel zo goed mogelijk afgestemd op het broedseizoen van de Grutto. De overige aanwezige weidevogelsoorten worden op kaart ingetekend om informatie te verzamelen over hun huidige verspreiding. Met protocol 14.011 worden alleen de territoria van Grutto's opgenomen.

De terreinen worden gebiedsdekkend geïnventariseerd. Dat houdt in dat insteken gemaakt worden over percelen om moeilijk vanaf openbare wegen te overziene gebieden te bekijken. Voor het betreden van percelen of kavelpaden wordt vooraf toestemming gevraagd aan de eigenaren. Notaties van waargenomen vogels volgen de richtlijnen van het BMP.

De twee bezoeken worden uitgevoerd tussen 1 april en 10 mei met ten minste 10 dagen tussen elke ronde; dit zijn de zogenoemde datumgrenzen van Grutto die in BMP gebruikt worden bij het bepalen van territoria van deze soort. Behalve Grutto's worden ook alle andere weidevogelsoorten genoteerd (Kievit, Scholekster, Tureluur, Veldleeuwerik, Graspieper, Gele kwikstaart, Zomertaling, Slobeend, Patrijs, Kuifeend, Krakeend, Wintertaling, Kempphaan, Wulp, Tafeleend, Bergeend, Knobbelzwaan, Watersnip, Kwartel en Kwartelkoning) volgens de richtlijnen van het BMP. Deze soorten worden als losse waarnemingen geladen via protocol 14.100.

VAN DIJK A.J. & BOELE A. 2011. Handleiding Sovon Broedvogelonderzoek. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.